

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
TỈNH BÌNH PHƯỚC  
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /CCTTBVTV-NV

Bình Phước, ngày tháng năm 2025

V/v hướng dẫn phòng, chống dịch  
hại cây trồng và giải pháp khắc phục  
thiệt hại sau mưa trái mùa.

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp/ Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố.

Trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số cơn mưa trái mùa, lượng mưa lớn và phân bố diện rộng ở hầu hết các nơi trong tỉnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây điều và cây sầu riêng đang trong thời kỳ ra hoa, đậu trái.

Để hướng dẫn phòng, chống dịch hại trên các loại cây trồng và giải pháp khắc phục thiệt hại do mưa trái mùa gây ra, Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị các đơn vị chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố hợp chỉ đạo triển khai thực hiện một số giải pháp như sau:

1. Ảnh hưởng của mưa đến cây trồng.

- Đối với cây điều: Khu vực có mưa lớn và cây điều đang ra trái non thường ít bị ảnh do mưa. Đối với khu vực mưa nhỏ, rải rác và cây đang ra hoa, giai đoạn này cây điều bị ảnh hưởng của quá trình thụ phấn nên ảnh hưởng đến năng suất về sau.

- Đối với cây Sầu riêng: Khu vực có mưa lớn dẫn đến sầu riêng bị sốc nước làm rụng bông và trái non ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng vườn cây.

2. Diễn biến sâu bệnh hại.

2.1. Đối với cây điều:

Sâu bệnh hại thời gian này chủ yếu là bọ trĩ, bọ xít muỗi, sâu đục trái và bệnh thán thư gây hại khá phổ biến trên diện tích điều toàn tỉnh mức độ hại từ nhẹ đến trung bình.

2.2 Đối với cây sầu riêng:

Sâu bệnh hại thời gian này chủ yếu là nhện đỏ, rầy xanh, sâu ăn bông và bệnh nứt thân xì mũ gây hại rải rác hầu hết diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh.

3. Biện pháp quản lý.

3.1. Đối với cây điều: Khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm vườn, điều tra tình hình sâu bệnh hại trong suốt thời kỳ ra bông đậu trái. Đặc biệt sau mưa cần xịt thuốc rửa bông kết hợp phòng trị sâu bệnh hại kết hợp bổ sung can xi bo,

thuốc trừ sâu sinh học, và thuốc trừ bệnh Antracol 70WP phun phòng để hạn chế khô bông rụng trái. Đồng thời phòng trị sâu bệnh hại hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

3.2. Đối với cây sầu riêng: Thường xuyên theo dõi vườn cây đối với những vùng mưa lớn cây dư nước nên khẩn trương khơi rãnh thoát nước, điều tiết nước phù hợp trong mùa khô hạn chế bị sốc nhiệt và nước trong giai đoạn ra hoa, xỏ nhị và đậu trái non. Trước khi xỏ nhị 10-15 ngày bổ sung NPK, trung vi lượng, trước lúc xỏ nhị 5-7 ngày tăng cường 1-2 lần các trung vi lượng qua lá, đặc biệt là Bo, xịt thuốc điều hòa sinh trưởng hoặc rong biển kết hợp thuốc trừ sâu bệnh nhằm hạn chế rụng bông và trái non. Đồng thời phòng trị nhện đỏ, rầy xanh, sâu ăn bông trong giai đoạn này. Kiểm tra xử lý MKP, KNO<sub>3</sub>...không để cây ra đọt làm rụng bông và trái non hàng loạt.

Trên đây là một số biện pháp khắc phục những thiệt hại do mưa trái mùa gây ra của Chi cục Trồng trọt và BVTV, đề nghị các đơn vị chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo diễn biến mưa trái mùa, sâu bệnh hại hàng tuần về Chi cục Trồng trọt và BVTV để hướng dẫn kịp thời hiệu quả nhằm hạn chế thiệt hại gây ra ./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- GD, các PGĐ Sở (báo cáo);
- UBND các huyện, TX, TP (chỉ đạo);
- Lãnh đạo Chi cục;
- Lưu: VT, NV (Trung).

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Lê Thúc Long**