

HƯỚNG DẪN

Chăm sóc, phòng chống dịch hại sau mưa trái mùa trên sầu riêng.

Hiện nay sầu riêng đang ở giai đoạn sau xả nhị - trái non. Đây là giai đoạn cây sầu riêng mẫn cảm với thời tiết đặc biệt là mưa trái mùa làm cây bị sốc nước làm rụng trái non, đồng thời mưa cũng làm sầu riêng dễ đi đợt dẫn đến cạnh tranh dinh dưỡng gây rụng trái non, ảnh hưởng đến năng suất của sầu riêng. Trong khi đó theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia thì trong 10 ngày tới khả năng xuất hiện mưa trái mùa vào chiều và tối.

Để có biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại kịp thời trong giai đoạn này. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Bù Đăng đề nghị UBND các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn nông dân một số biện pháp cụ thể như sau:

1. Về chăm sóc:

Thường xuyên theo dõi vườn cây đối với những vùng mưa lớn cây dư nước nên khẩn trương khơi rãnh thoát nước, điều tiết nước phù hợp trong mùa khô hạn chế bị sốc nhiệt và nước trong giai đoạn sau xả nhị và đậu trái non.

Phân bón: Bón NPK: 12-12-17, NPK: 15.15.15, NPK : 15.11.18 (0,5 kg/gốc) bổ sung thêm Nitrabo YARA (15,4% N - Caxi Bo 26%) để hỗ trợ chống rụng trái.

Sau bón đợt 1 từ 10 – 15 ngày trái bằng quả cam tiếp tục bón NPK: 12-11-18, NPK: 16.16.16, NPK: 18.18.18 (0,5 – 0,7 kg/gốc tùy theo lực cây), bổ sung thêm Nitrabo YARA để hỗ trợ chống rụng trái.

* Lưu ý: Thời điểm này cây dễ đi đợt nên bón chú ý bón phân theo tỉ lệ tăng dần không bón nhiều 1 lúc. Nếu xảy ra trường hợp đi đợt cần xịt xử lý kịp thời bằng các loại thuốc chuyên chặn đợt như MKP, KNO₃,... để hạn chế rụng trái non.

2. Về sâu bệnh hại:

Sâu bệnh hại thời gian này chủ yếu là nhện đỏ, rầy xanh, bệnh nứt thân xì mù trên sầu riêng:

2.1. Nhện đỏ:

Nhện đỏ chích trên trái non và lá tạo thành những đốm đỏ nhỏ, làm cho vỏ trái và lá bị biến màu. Nếu mật độ nhện gây hại cao sẽ làm cho lá và trái non bị rụng.

Nhện phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

- Biện pháp phòng trừ:

Phun nước vào mùa nắng lên lá có thể làm giảm mật độ nhện tạo điều kiện cho thiên địch phát triển.

Phun các loại thuốc hóa học có thành phần hoạt chất như: *Imidacloprid*, *Lambda-Cyhalothrin*, *Abamectin*, *sulfur*, *Pyridaben*,... phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày

2.2. Bệnh xì mủ thân:

- Do nấm *Phytophthora* sp gây ra.

- Triệu chứng trên rễ: rễ non bị thối có màu nâu đen, rễ chết dần làm cây phát triển chậm, sau đó nấm lây lan dần đến phần thân cây phía trên làm chảy nhựa, cây không phát triển.

- Triệu chứng ở trên thân: Thân cây bị chảy nhựa trên bề mặt vỏ thân, vết bệnh ướt và nhựa có màu nâu. Vỏ thân và gỗ bên dưới bị chuyển sang màu hồng nhạt, có bột tím, viền gợn sóng, bệnh lan dần vào bó mạch. Khi cạo lớp vỏ bị bệnh ra lấy phần gỗ có màu nâu sẫm dọc theo thân, cành. Cây bị bệnh nặng không phát triển.

- Triệu chứng trên trái: Vết bệnh xuất hiện dọc theo chiều từ cuống trái lan xuống xung quanh trái. Vết bệnh nặng sẽ phát triển loang lổ hoặc hình tròn màu nâu trên vỏ trái sần riềng. Thông thường, bệnh nứt thân xì mủ sẽ làm trái sần riềng rụng trước khi chín.

Biện pháp phòng trừ:

- Rải vôi xung quanh tán cây và quét lên gốc cây trong phạm vi 0,5-1,2 m từ mặt đất (sử dụng vôi đậm đặc quét lên thân chính) vào cuối mùa nắng hay đầu mùa mưa.

- Khi thấy vết chảy nhựa xuất hiện, dùng dao cạo bỏ hết phần vỏ và gỗ bị thối nâu, dùng các thuốc có hoạt chất như: *Fosetyl-aluminium*, *Mancozeb*+*Metalaxyl*,... pha với liều lượng 50 g/lít nước dùng cọ bôi lên vết bệnh 2-3 lần, lần cách lần 7-10 ngày.

- Phun tán cây: có thể dùng các thuốc có hoạt chất như: *Mancozeb*+*Metalaxyl*, *Fosetyl-aluminium*, *Phosphorous acid*, *Dimethomorph*,... phun định kỳ 3 tháng/lần. Nên phun vào sáng sớm hay chiều mát với liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì.

- Tưới gốc: có thể dùng các thuốc có hoạt chất như: *Phosphorous acid*, *Mancozeb*+*Metalaxyl*,... tưới ướt toàn bộ vùng rễ. Tùy đường kính tán mà lượng dung dịch thuốc tưới cho phù hợp, liều lượng sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

2.3. Rầy xanh:

Rầy trưởng thành và rầy non đều gây hại cho cây sần riềng bằng cách chích hút nhựa của lá non, vì thế chúng thường có mật số rất cao trong các đợt cây ra đợt non lá non.

Biện pháp phòng trừ:

- Sử dụng vôi phun nước áp lực cao phun lên tán cây, hạn chế mật số rầy xanh và rầy nhảy, rệp.

- Khi phát hiện xuất hiện rầy trong vườn, hay các giai đoạn khi sâu riêng ra cơi đọt mới, sử dụng các thuốc có nguồn gốc sinh học như: *Abamectin*, *Emamectin Benzoat*, dầu khoáng như SK Enpray 99EC, DS 98.8EC,... hoặc sử dụng các thuốc hóa học như: *Spirotetramat*, *Azadirachtin*, *Clothianidin*, *Abamectin* + *BT*, *Cyantraniliprole*,... phun 1 - 2 lần, lần cách lần 7 - 10 ngày, để phòng và trừ rầy.

Trên đây là một số biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh sau mưa trái mùa. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai và thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Ban tuyên giáo và dân vận huyện ủy;
- Phòng nông nghiệp và môi trường;
- Trung tâm VH-TT và Đài TT-TH;
- UBMTTQ VN huyện;
- Hội Nông dân huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- GD, các PGD TT DVNN;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Minh Hiếu