

UBND HUYỆN BÙ ĐĂNG
TRUNG TÂM
DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
Số: 11 /TB-TTĐVNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bù Đăng, ngày 28 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v phòng trừ sâu bệnh trên cây điều giai đoạn ra hoa, đậu trái

Hiện nay điều đang ở giai đoạn ra hoa và đậu trái đây là giai đoạn cây điều mẫn cảm với thời tiết. Trong khi đó tình hình thời tiết hiện nay không thuận lợi cho cây điều, ngày nắng nóng, đêm lạnh, biên độ nhiệt chênh lệch ngày và đêm lớn, xuất hiện mưa trái mùa. Tạo điều kiện thuận lợi cho bọ xít muỗi, rầy mềm, rệp sáp, bọ trĩ, bệnh thán thư.

Để có biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại kịp thời trong giai đoạn này. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Bù Đăng đề nghị UBND các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn nông dân một số biện pháp cụ thể như sau:

1. Bọ xít muỗi:

Thường xuất hiện, gây hại vào sáng sớm và chiều mát, chúng chích hút vào mô non của cây như chồi, lá non, hoa, quả và hạt làm cho các bộ phận bị hại héo khô và rụng, tạo điều kiện cho bệnh thán thư, cháy lá khô cành phát triển.

Biện pháp phòng trừ:

Làm cỏ vệ sinh vườn, phát quang bụi rậm, hun khói vào sáng sớm hoặc chiều mát để xua đuổi bọ xít muỗi. Có thể dùng các loại thuốc BVTV có chứa các hoạt chất như: *Alpha Cypermethrin; Cypermethrin; Thiamethoxam, Lambda-Cyhalothrin, Deltamethrin ...* Phun 1-2 lần, lần cách lần từ 7-10 ngày.

2. Bọ trĩ:

Bọ trĩ phá hại nhiều vào giai đoạn cây ra đọt non, ra bông và đậu trái. Do vòng đời ngắn nên bọ trĩ có rất nhiều thế hệ liên tiếp nhau gây hại nặng cho điều.

Bọ trĩ gây hại nặng bằng cách chích rạch lớp biểu bì ở bộ phận còn non và liếm hút nhựa chảy ra nên lá đọt kém phát triển, có màu trắng bạc, hoa và trái non bị khô và rụng, vỏ hạt bị hiện tượng da cám, vỏ trái giả bị chai sần, nứt chảy nước và thối.

Bọ trĩ phát triển mạnh trong điều kiện nắng nóng, nhiệt độ cao.

Biện pháp phòng trừ:

Dùng thuốc có chứa các hoạt chất: *Thiamethoxam, Spirotetramat, Phenthoate + Fenobucarb, Spinetoram* hay hỗn hợp *Thiamethoxam + Lambda - Cyhalothrin...* Phun 1-2 lần, lần cách lần 7-10 ngày.

3 Rầy mềm, rệp sáp:

Thường gây hại trên đọt non, hoa và trái non.

Biện pháp phòng trừ:



Khi bị rầy mềm hoặc rệp sáp gây hại sử dụng các loại thuốc có hoạt chất sau: *Spirotetramat, Thiamethoxam, Permethrin, Abamectin...* Phun 1-2 lần, lần cách lần từ 7-10 ngày.

4. Bệnh thán thư:

Bệnh do nấm *Colletotrichum gloeosporioides* gây ra thường phát sinh trong điều kiện ẩm độ cao, mưa kéo dài và thiếu ánh sáng,

Bệnh thường xuất hiện khi điều ra lá non, có nụ hoa hoặc bắt đầu đậu trái, làm giảm năng suất và chất lượng hạt điều.

Biện pháp phòng trừ:

Sử dụng một số thuốc có hoạt chất sau: *Propiconazole, Hexaconazol, Propineb, Azoxystrobin, Difenoconazole + Propiconazole, Tebuconazole + Propiconazole...* Phun 2-3, lần cách lần từ 7-10 ngày.

***Để có biện pháp hỗ trợ cây điều giai đoạn ra hoa và đậu trái được tốt trong điều kiện thời tiết khô lạnh có sương mù và mưa trái mùa.**

Sử dụng thêm một số loại phân bón lá như Canxibo, Botrac, các loại phân bón lá có NPK +TE, Kali + Bo...để tăng tỷ lệ thụ phấn, tăng đề kháng cho cây trồng, hạn chế rụng hoa, trái non, nuôi trái và chắc hạt.

Sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ sâu, bệnh ngay sau khi xuất hiện mưa trái mùa.

* Chú ý:

- Nên phun xịt thuốc trước 09 giờ sáng và sau 16 giờ chiều.
- Cần thăm vườn thường xuyên để phát hiện sâu, bệnh hại để sớm có biện pháp xử lý kịp thời.
- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 04 đúng và đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ như: găng tay, khẩu trang, quần và áo bảo hộ lao động./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng NN& PTNN huyện;
- Phòng VH-TT huyện;
- BTG Huyện ủy;
- Hội Nông dân huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- GD, các PGĐ TT DVNN
- Lưu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Huỳnh Văn Chánh